

mercaptizole (מרקפטיזול) או PTU

שתי תרופות אלו ניתנות לחולים שכמוך, סובלים מפעילות יתר של בלוטת מגן (תירואיד). לחלק מהחולים התרופות ניתנות למשך תקופה ארוכה של שנה עד שנתיים, בחלק מהחולים התרופות ניתנות לזמן קצר יותר להשגת איזון פעילות הבלוטה לפני טיפול כמו ניתוח או מתן של יוד רדיואקטיבי.

ברוב רובם של המקרים אין כל בעיה במתן תרופות אלה אשר נסבלות היטב ע"י החולים. אולם, כמו כל תרופה, גם לתרופות אלה ישנן תופעות לוואי ועל החולה לדעת על קיומן.

התופעות השכיחות ביותר הן גרד והופעה של פריחה. אם דבר כזה קורה לך בזמן נטילת התרופה, יש לפנות אלינו. במקרים כאלה הרופא/ה המטפל/ת י/תחליט אם להמשיך או להפסיק את התרופה. **אין כל סכנה בתופעות אלה.** במקרים מאוד נדירים, כתוצאה מנטילת התרופות הללו עלולה להופיע תופעה הנקראת אגרולוציטוזיס. זהו ירידה קיצונית במספר כדוריות הדם הלבנות.

תופעה נדירה זו קורת מבלי שניתן לחזור אותה מראש. היא יכולה לקרות גם עם כל מינון, ובכל זמן לאחר תחילת טיפול.

בשל ירידה בכדוריות דם אלה הגוף חשוף לזיהומים ע"י חיידקים, **וביטוי לכך יכול להיות הופעה פתאומית של חום גבוה או כאב גרון.**

אם המצב מאובחן כראוי, הפסקת התרופה מביאה במרבית המקרים להחלמה והתאוששות.

לכן, אם בזמן נטילת אחת התרופות הללו סימן המחשיד לזיהום חריף מופיע אצלך, עליך לפנות בדחיפות לרופא/ה המטפל/ת או לחדר מיון לצורך בדיקת מספר כדוריות הלבנות שבדמך.