

عقاقير لعلاج الغدة الدرقية PTU أو Mercaptizole

تعطى هذه العقاقير للمريض الذي يعاني من إفراز في عمل الغدة الدرقية (Thyroid). ويتوجب على بعض المرضى تناول هذه العقاقير لفترات طويلة تتراوح بين سنة أو سنتين أما القسم الآخر من المرضى فيكفي العلاج لفترة زمنية قصيرة لكي يتوازن عمل الغدة أو يتسنى العلاج بالجراحة أو اليود المشع .

على الغالب لا يوجد أي أعراض جانبية لهذه العقاقير ولكن في بعض الحالات يكون هناك أعراض جانبية ومن المستحسن أن تكون معروفة للمريض .
العوارض الشائعة :-

- حكة

- طفح جلدي

- ارتفاع في إنزيمات الكبد

وفي حالة ظهور هذه العوارض يتوجب إعلام الطبيب المعالج أو أخصائي الغدد من أجل أن يقرر استمرار أو التوقف عن العلاج .
في بعض الأحيان النادرة ممكن ظهور (Agranulocytosis) وهو انخفاض شديد في عدد كريات الدم البيضاء .

هذه الظاهرة تظهر دون أي تنبيه سابق , بدون علاقة بكمية العقاقير أو زمن العلاج , انخفاض عدد كريات الدم البيضاء يعرض الجسم للالتهابات والأمراض المسببة من الجراثيم , و تظهر بصورة ارتفاع درجة الحرارة أو التهابات في الحلق .
إذا شخصت الحالة في الوقت المناسب فيمكن إيقاف العلاج بالعقاقير المذكورة أعلاه الشيء الذي يمكن الجسم من الشفاء .

لذا في حالة تناولك العقاقير المذكورة أعلاه إذا ما كان هناك ارتفاع في درجة الجسم الحرارة أو التهاب بالحلق فيجب التوجه فوراً للطبيب المعالج أو غرفة الطوارئ ,
لفحص عدد كريات الدم البيضاء , وإذا تبين أن هنالك انخفاض في عدد كريات الدم البيضاء فيجب التوقف عن تناول PTU أو Mercaptizole