

نشكركم على توجهم مؤخرًا بالنسبة لـ الكتروكسين (Levothyroxine).

أفهم من ذلك أنكم ترغبون بتلقي معلومات حول تفتيت/سحق القرص.

نشرة المعلومات الإسرائيلية للطبيب حول مواصفات المنتج، SPC. (١)

كما تعلمون أن المعلومات الإسرائيلية للطبيب SPC تشمل المعلومات ذات العلاقة التالية:

معلومات سريرية

الجرعة الدوائية والإعطاء

بسبب النقص في المعلومات، من غير المستحسن تفتيت/سحق أقراص تيروكسين ولا يجوز شطر أقراص تيروكسين إلى نصفين الغير معلمة بخط للشطر. من المفضل تناول أقراص تيروكسين على معدة خاوية.

تحذيرات ووسائل الحذر

إن لـ تيروكسين مؤشر علاجي ضيق. جرعة دوائية ملائمة من تيروكسين تستند على تقييم سريري ومراقبة وظائف الغدة الدرقية بالفحوص المخبرية. أثناء فترة المعايرة الأولية، يتطلب إجراء معايرة حذرة للجرعة الدوائية ومراقبة من أجل تجنب حالات فرط الجرعة أو نقص الجرعة. إن الأعراض لفرط جرعة تيروكسين تشبه ملامح كثيرة للانسمام الدرقي الداخلي المنشأ.

حركية الدواء

الامتصاص

إن امتصاص تيروكسين بعد الإعطاء الفموي هو غير كامل ومتغير، خاصة عندما يتم تناول القرص مع الطعام. إن الكمية الممتصة تزداد في حالات الصوم.

نشرة معلومات للمستهلك (٢)

لا يجوز المضغ. يجب بلع الدواء مع القليل من الماء. لا يجوز تفتيت/سحق أو شطر القرص إلى نصفين. يوصى بتناول الدواء على معدة خاوية.

الثبات الكيماوي والمكافي الحيوي

ليست هناك معطيات ثبات خاصة حول أقراص متفتتة/مسحوقة، لكن أثناء الفحوص التحليلية/فحوص الانحلال، فإن الأقراص انحلت في محاليل مائية. نتيجة لذلك تم إيضاح أن الأقراص المتفتتة/المسحوقة التي أدخلت حالاً إلى الماء وتم تناولها مباشرة بعد تحضير مثل هذه المزائج هي ثابتة من الناحية الكيماوية لفترة زمنية ما (مثلاً، ٤٥ دقيقة بدرجة حرارة الغرفة). لذلك، المعطيات التي بحوذتنا تدعم فقط الثبات الكيماوي لأقراص التروكسين المتفتتة/المسحوقة في الماء مباشرة قبل الاستعمال. إضافة لذلك، يجب الحرص على تناول كامل الجرعة المحددة.

وجهة نظر سريرية

على ضوء كل ما قيل سابقاً، من المهم الذكر أنه على الرغم من أن شركة Aspen لا توصي بتفتيت/بسحق الأقراص، فمن المعروف أن هناك حالات يقومون فيها بفعل ذلك. وأي انحراف عن المعلومات المذكورة في نشرة المستحضر هي من إجتهد (وجهة نظر) الطبيب المعالج. يجب دراسة القرار بإعطاء الأقراص بطريقة مختلفة عن المعلومات المذكورة في نشرة المستحضر مقابل الخطورة بعدم إعطاء علاج أو أن المريض لا يتلق الجرعة الدوائية بكاملها. كما تفهمون، إن أحد التطلعات الأكثر أهمية في علاج فرط الدرقية هو المواظبة في إعطاء الدواء وإجراء الفحوص المنتظمة لوظائف الغدة الدرقية، ونتيجة لذلك يتطلب ملاءمات للجرعة الدوائية.

آمل أن هذه المعلومات هي ذات قيمة.

الرجاء، لا تترددوا في السؤال مجدداً إذا كنا نستطيع المساعدة بمعلومات إضافية.

مع فائق الاحترام،

خدمة المعلومات الطبية

البريد الإلكتروني للمعلومات الطبية: aspenglobal@professionalinformation.co.uk

خط مباشر لخدمة المعلومات الطبية بإسرائيل: ٨٣٢ ٢١٢ ١٨٠٩ (مجّاناً) أو ٣٧٩ ٨٢٨ ١٧٤٨ ٤٤+

مراجع:

١- Israeli Eltroxin, Summary of Product Characteristics, Perrigo on behalf of Aspen (Aug 2010)

٢- Israeli Eltroxin, Patient Information Leaflet, Perrigo on behalf of Aspen (Mar 2010)

أجريت هذه الترجمة بواسطة عامل خارجي وهي غير ملزمة، والنص المحدد هو باللغة الإنكليزية.