

# עלון מידע על תרופות ממשפחת מעכבי SGLT2

מטופל יקר, לאחרונה קיבלת טיפול ממשפחת מעכבי SGLT2. משפחת תרופות זו נכנסה לשימוש נרחב בשנים האחרונות, ולה יתרונות רבים בטיפול בחולה הסוכרתי. התרופות הזמינות ממשפחה זו הן:

סטגלטרו  
(Steglatro)  
סגלורומט  
(Segluromet)

ג'ארדיאנס  
(Jardiance)  
ג'ארדיאנס דואו  
(Jardiance duo)  
גליקסמבי  
(Glyxambi)


פורסיגה  
(Forxiga)  
קסיגדו XR  
(XigduoXR)

**להלן הנחיות לשימוש נכון בתרופות ממשפחה זו:**

## על מה להקפיד?

שתייה בכמות נאותה 

מעקב לחץ דם 

מעקב ערכי סוכר 

**תרופות ממשפחת מעכבי SGLT2 אינן תחליף לאינסולין** 

**מצבים בהם יש להפסיק זמנית טיפול בתרופה ממשפחה זו:**

(יש ליצור קשר עם הרופא במקביל להפסקת הטיפול)

• 3 ימים לפני ניתוח

• בזמן אשפוז

• בזמן מחלת חום או זיהום משמעותי

• התחלת דיאטה קטוגנית (דלת פחמימות) - להתייעץ עם רופא

• צום מכל סיבה שהיא (לפני צום רמדאן יש להתייעץ עם הרופא המטפל)

לא לשכוח לדבר עם הרופא על  
חידוש הטיפול כשמרגישים טוב יותר

**מצבים בהם יש לפנות מידית לרופא:**

קוצר נשימה • בחילות והקאות • חולשה



לשים לב – לא להסתמך רק על רמות הסוכר. חמצת קטוטית (DKA) יכולה להתפתח גם כאשר ערכי הסוכר תקינים

דף זה אינו מהווה תחליף לקריאת העלון לצרכן כפי שאושר על ידי משרד הבריאות ואינו מהווה תחליף להתייעצות עם רופא.

הוכן על ידי דר' הדר דסקין ביתן ודר' ברנייה קלברייסקי