



התחילו: 105
 השלימו: 62
 לא השלימו: 43



1. אנא דרג/י את ההמלצה הבאה: אין לבצע US תריס לבירור הפרעה בתפקוד הבלוטה ללא ממצא מישושי (מטריצת אפשרויות)

1. חשיבות ההמלצה מ-1 עד 5:
 (בחירה יחידה)

תגובות		
24	40%	5 גבוהה מאוד
11	18.33%	4 גבוהה
13	21.67%	3 ממוצעת
8	13.33%	2 נמוכה
4	6.67%	1 נמוכה מאוד
ענו על השאלה: 60		
דילגו על השאלה: 2		

2. אנא דרג/י את ההמלצה הבאה: אין לבצע US צוואר בשל סימפטומים שאינם חשודים כגוש לוחץ (כגון רפלוקס) בלא ממצא מישושי (מטריצת אפשרויות)

1. חשיבות ההמלצה מ-1 עד 5:
 (בחירה יחידה)

תגובות		
36	59.02%	5 גבוהה מאוד
12	19.67%	4 גבוהה
10	16.39%	3 ממוצעת
3	4.92%	2 נמוכה
0	0%	1 נמוכה מאוד
ענו על השאלה: 61		
דילגו על השאלה: 1		

3. אנא דרג/י את ההמלצה הבאה: אין לבדוק נוגדנים נגד TPO באופן רוטיני ואין לעקוב אחרי הכייל שלהם (מטריצת אפשרויות)

1. חשיבות ההמלצה מ-1 עד 5:
(בחירה יחידה)

תגובות		
30	49.18%	5 גבוהה מאוד
18	29.51%	4 גבוהה
9	14.75%	3 ממוצעת
3	4.92%	2 נמוכה
1	1.64%	1 נמוכה מאוד
ענו על השאלה: 61		
דילגו על השאלה: 1		

4. אנא דרג/י את ההמלצה הבאה: אין צורך לבדוק FT3, FT4 במטופלים ללא חשד להפרעת תפקוד התריס או למטופלים יציבים על מינון קבוע (מטריצת אפשרויות)

1. חשיבות ההמלצה מ-1 עד 5:
(בחירה יחידה)

תגובות		
21	33.87%	5 גבוהה מאוד
25	40.32%	4 גבוהה
12	19.35%	3 ממוצעת
3	4.84%	2 נמוכה
1	1.61%	1 נמוכה מאוד
ענו על השאלה: 62		
דילגו על השאלה: 0		

5. אנא דרג/י את ההמלצה הבאה: אין לרשום טיפול בטסטוסטרון ללא עדות ביוכימית לחסר ההורמון (מטריצת אפשרויות)

1. חשיבות ההמלצה מ-1 עד 5:
(בחירה יחידה)

תגובות		
44	70.97%	5 גבוהה מאוד
12	19.35%	4 גבוהה
4	6.45%	3 ממוצעת
1	1.61%	2 נמוכה
1	1.61%	1 נמוכה מאוד
ענו על השאלה: 62		
דילגו על השאלה: 0		

6. אנא דרג/י את ההמלצה הבאה: אין להנחות חולים יציבים עם T2DM אשר אינם נוטלים תרופות הגורמות להיפוגליקמיה לבצע בדיקות עצמיות חוזרות של גלוקוז (מטריצת אפשרויות)

1. חשיבות ההמלצה מ-1 עד 5:
(בחירה יחידה)

תגובות		
8	12.90%	5 גבוהה מאוד
19	30.65%	4 גבוהה
17	27.42%	3 ממוצעת
10	16.13%	2 נמוכה
8	12.90%	1 נמוכה מאוד
ענו על השאלה: 62		
דילגו על השאלה: 0		

7. אנא דרג/י את ההמלצה הבאה: אין לבדוק HbA1c בחולי סוכרת עם CKD4 או בחולים בדיאליזה (מטריצת אפשרויות)

1. חשיבות ההמלצה מ-1 עד 5:
(בחירה יחידה)

תגובות		
10	16.67%	5 גבוהה מאוד
19	31.67%	4 גבוהה
14	23.33%	3 ממוצעת
12	20%	2 נמוכה
5	8.33%	1 נמוכה מאוד
ענו על השאלה: 60		
דילגו על השאלה: 2		

8. אנא דרג/י את ההמלצה הבאה: אין להפנות להדמיה (US או מיפוי) באבחנה של היפר-פראתירואידיזם אם לא מתוכנן ניתוח (מטריצת אפשרויות)

1. חשיבות ההמלצה מ-1 עד 5:
(בחירה יחידה)

תגובות		
35	56.45%	5 גבוהה מאוד
14	22.58%	4 גבוהה
6	9.68%	3 ממוצעת
5	8.06%	2 נמוכה
2	3.23%	1 נמוכה מאוד
ענו על השאלה: 62		
דילגו על השאלה: 0		

9. אנא דרג/י את ההמלצה הבאה: אין לתת טיפול אינטנסיבי באינסולין במטרה להשיג נורמוגליקמיה בחולים עם T2DM (מטריצת אפשרויות)

1. חשיבות ההמלצה מ-1 עד 5:
(בחירה יחידה)

תגובות		
7	11.29%	5 גבוהה מאוד
8	12.90%	4 גבוהה
14	22.58%	3 ממוצעת
19	30.65%	2 נמוכה
14	22.58%	1 נמוכה מאוד
ענו על השאלה: 62		
דילגו על השאלה: 0		

10. הערות:
(שאלה פתוחה)

תגובות	
5	
ענו על השאלה: 5	
דילגו על השאלה: 57	